

Hur smittas hundar?

Tre av hundra hundar har spolmask²⁾. Den vanligaste orsaken är att hundar får i sig ägg eller larver från omgivningen.

Valpar smittas ofta redan i fosterstadiet eller via modersmjölken och spolmaskinfektion hos valpar är därför mycket vanligt.

Hur vet jag när min hund behöver avmaskas?

Tecken på spolmaskinfektion:

- ☐ Dålig tillväxt
- ☐ Dålig pälskvalitet
- ☐ Trötthet
- ☐ Diarré och kräkningar
- ☐ Svullen buk
- ☐ Hosta och näsflöde hos valpar
- ☐ Maskar eller ägg i avföringen. Maskarna är 3-10 cm långa och spaghetti-liknande.

Om du är osäker på om din hund har mask ska du vända dig till din veterinär, eller skicka in ett avföringsprov för analys till t.ex. SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

Vad ska man tänka på när man avmaskar sitt husdjur?

Avmaska klokt och undvik risk för resistensutveckling. Behandla bara hundar som behöver avmaskas. Väg hunden och dosera noga. Tala med din veterinär - där kan du få tips och råd angående avmaskning.

²⁾ Uppgiften hämtad från www.SVA.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund

Preparaten är receptfria läkemedel och finns på apotek.



Banminth® vet. 2,2 % oral pasta

Tydlig doseringsangivelse

En dos per behandling

Receptfritt läkemedel



För mer information om Banminth vet.
kontakta oss gärna:

Pharmaxim

Tel: 042 38 54 50, info@pharmaxim.com
www.pharmaxim.com

Tillverkare: **zoetis**

Texten är baserad på produktresumé daterad 2015-07-27. För mer information läs bipacksedeln eller gå in på www.fass.se. Texten granskad och godkänd av Leg. veterinär (Doctor of Veterinary Medicine) Johannes Larsson, Pharmaxim 2016-12-29.

Hur ska hundar avmaskas på ett bra sätt?

Banminth® vet.
Pyrantelembonat



Receptfritt avmaskningsmedel för behandling av spolmask och hakmask i tarmen hos hund.



Olika typer av mask

Spolmaskar

Spolmask är en av de vanligaste parasiterna hos hund. De är gul-vita i färgen, långsmala och kan bli 3-10 cm långa. Vuxna hundar smittas via avföring eller när de äter små gnagare.

Valpar smittas i fosterstadiet eller från modersmjölken.

Hundens spolmask kan smitta till människor.

Banminth vet. är ett effektivt avmaskningsmedel för behandling av spolmask hos hund.

Hakmaskar

Hakmaskar hos hund är relativt ovanligt i Sverige, men förekommer ofta hos hundar utomlands. Importerade hundar löper därför större risk att bära med sig hakmaskinfektion.

Banminth vet. är ett effektivt avmaskningsmedel för behandling av hakmask hos hund.



Vad är Banminth vet.?

Banminth vet. är ett receptfritt avmaskningsmedel som är effektivt mot spolmask och hakmask hos hund. Banminth vet. har få biverkningar och risken för överdosering är liten.

Hur används Banminth vet.?

Banminth vet. är en pasta som ges i munnen till hunden och finns på tub eller som förfylld doseringsspruta. Väg hunden före behandling för rätt dosering.

Av tuben ges 2 cm lång sträng per kg hunden väger. Tuben finns i två storlekar - 10 g som räcker till 15 kg hund och 24 g som räcker till 36 kg hund.

Dosering	
Hundens vikt	Av tuben ges
2 kg	4 cm
4 kg	8 cm
10 kg	20 cm



Vuxna hundar

Vuxna hundar ska avmaskas när de har tecken på spolmaskinfektion. Det räcker oftast med en behandling, men i vissa fall behöver behandlingen upprepas efter ca 14 dagar.

Valpar

Valpar kan smittas av spolmask redan i fosterstadiet eller via modersmjölken. Tiken kan bära på vilande spolmaskar även om hon inte visar några symptom på det. Spolmasken aktiveras under dräktigheten och överförs då till valparna. Valpar kan behandlas från ett par veckors ålder¹⁾ och därefter vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder. Det är bra att behandla tiken samtidigt som valparna vid de två första behandlingarna (d.v.s när valparna är 2 och 4 veckors gamla).

¹⁾ Uppgiften hämtad från en guideline utgiven av European Scientific Counsel Companion Animals Parasites (ESCCAP).